

نجات جان مادر

بیش از 12 ساعت تلاش بی وقفه تیم Multidisciplinary مرکز آموزشی ، درمانی الزهراء(س)



بیمار خانم 25 ساله G2P1AL1 باردار 38 هفته با ایکتز از 3 روز قبل و آزمایشات قبلی end organ damage (کلیه، کبد، پلاکت و انعقاد مختل ، بیلی روبین بالا) و وضعیت DIC (INR>5 , 80>Fib , PT>60 , PTT>120) در مورخ 97/4/6 به مرکز آموزشی ، درمانی الزهراء ارجاع شده و با تشخیص Acute fatty lever بستری شد و بطور اورژانسی اقدام به ختم بارداری به روش NVD گردید. بعد از زایمان دچار آتونی رحم و Sever post partum hemmorrhge گردید. ابتدا به سرعت اقدام به استفاده از روشهای مدیکال و کنسرواتوئو کنترل خونریزی شد ، بدلیل انعقاد مختل و وضعیت DIC ، تصمیم به استفاده از روشهای جراحی کنترل خونریزی، چالش برانگیز بود. ولی بدلیل عدم کنترل خونریزی و جمع نشدن رحم و شدت خونریزی ، اقدام به هیستریکتومی شده بعد از هیستریکتومی نیز خونریزی ادامه داشت، بنابراین اقدام به بستن عروق ایلیاک داخلی 2 طرفه گردید. با بستن عروق ایلیاک خونریزی کنترل شد . بیمار در طی اقدامات فوق 31 واحد فرآورده خونی (پکدسل ، FFP ، کرایو پرسپیپتیا ، پلاکت و فیبرینوژن) دریافت کرد ، با اقدامات سریع و بموقع بیمار تحت سرپرستی آنکال مرکز سرکار خانم دکتر مریم واعظی طی 18 ساعت از DIC خارج شد و از مرگ حتمی نجات یافت و 6 روز بعد از عمل در حالیکه تمامی ارگانهای مختل روبه بهبود بودند با حال عمومی خوب ترخیص گردید.